



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE

10/08/2026

Desde el inicio de la nueva temporada de dengue, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS^{2.0}) 27.945 casos sospechosos de dengue, de los cuales 70 fueron confirmados por laboratorio, detectándose la circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3. El 56% corresponde a casos sin antecedente de viaje.

Durante la semana epidemiológica (SE) 30 de 2026 se notificaron 117 casos sospechosos. Estos eventos pueden corresponder a SE previas, dado que la fecha de apertura puede diferir de las fechas de inicio de síntomas, consulta o toma de muestra. De ellos, 57 fueron descartados, uno fue confirmado, dos fueron clasificados como probables y los 57 restantes continúan como sospechosos en estudio. El caso confirmado corresponde a un residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permanece bajo investigación epidemiológica.

Distribución geográfica de los casos

Provincia/Región	Sin antecedente de viaje		Con antecedente de viaje		Laboratorio negativo	Sospechoso (sin laborat.)	Total notificados	Total de casos
	Confirmado por laborat.	Probable	Confirmado por laborat.	Probable				
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	23	26	9	3	470	197	728	32
Buenos Aires	10	61	6	11	1.452	390	1.930	16
Córdoba	2	5	2	—	2.727	158	2.894	4
Entre Ríos	—	4	4	1	332	7	348	4
Santa Fe	—	26	2	2	1.293	75	1.398	2
Centro	35	122	23	17	6.274	827	7.298	58
Mendoza	—	—	2	1	139	3	145	2
San Juan	—	—	—	—	43	—	43	—
San Luis	—	—	—	—	84	18	102	—
Cuyo	—	—	2	1	266	21	290	2
Chaco	—	10	—	—	1.021	6	1.037	—
Corrientes	—	—	—	—	158	40	198	—
Formosa	2	2	1	—	5.584	—	5.589	3
Misiones	—	4	1	—	995	—	1.000	1
Noreste Argentino	2	16	2	—	7.758	46	7.824	4
Catamarca	1	6	—	—	484	4	495	1
Jujuy	1	1	1	—	1.444	40	1.487	2
La Rioja	—	6	—	—	260	2	268	—
Salta	—	35	—	—	3.412	1.175	4.622	—
Santiago del Estero	—	8	—	—	319	585	912	—
Tucumán	—	119	—	1	4.324	96	4.540	—
Noroeste Argentino	2	175	1	1	10.243	1.902	12.324	3
Chubut	—	—	—	—	18	2	20	—
La Pampa	—	—	—	1	89	10	100	—
Neuquén	—	—	3	—	28	4	35	3
Río Negro	—	—	—	—	4	—	4	—
Santa Cruz	—	—	—	—	32	3	35	—
Tierra del Fuego	—	—	—	—	15	—	15	—
Sur	—	—	3	1	186	19	209	3
Total Argentina	39	313	31	20	24.727	2.815	27.945	70

Casos de dengue, según clasificación y jurisdicción. Argentina. De semana 31 de 2025 a 30 de 2026. Fuente: Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud de Argentina.

- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):** 32 casos notificados. 22 casos sin antecedente de viaje, registrándose un conglomerado en la Comuna 10 (Villa Real) entre la SE 9 y la SE 17. El resto de los casos tienen residencia en las comunas 1, 7 y 9. Además, se notificaron nueve casos con antecedente de viaje a Brasil (DENV-3), Sri Lanka (DENV-3), Pakistán, México (DENV-3) y Venezuela. Durante la SE 30 se notificó un nuevo caso confirmado, que aún se encuentra bajo investigación epidemiológica.
- **Buenos Aires:** 16 casos. Diez casos sin antecedente de viaje en Tres de Febrero, José Clemente Paz, San Isidro, Cañuelas, Morón, La Matanza y San Nicolás. Seis casos con antecedente de viaje a Paraguay, México, Indonesia y Brasil.
- **Catamarca:** un caso sin antecedente de viaje, del departamento Ancasti (DENV-2).
- **Córdoba:** cuatro casos notificados. Dos casos con antecedente de viaje a México y tres casos sin antecedente de viaje en los departamentos Capital, San Justo y Colón.
- **Entre Ríos:** cuatro casos notificados con antecedente de viaje a Cuba, Brasil (DENV-3), República Dominicana y Colombia (DENV-3).
- **Formosa:** tres casos autóctonos. Un caso con residencia en el departamento Pilagás y uno en el departamento Patiño. Durante la SE 15 se notificó un nuevo caso con antecedente de viaje a Paraguay y cuyo serotipo detectado fue DENV-2.
- **Jujuy:** dos casos notificados. Uno con antecedente de viaje a Bolivia y otro (SE 19) sin antecedente de viaje, ambos en el departamento El Carmen (Perico). En ambos se detectó DENV-3.
- **Mendoza:** dos casos notificados, con antecedente de viaje a México (DENV-3), Brasil y Maldivas.
- **Misiones:** un caso notificado con antecedente de viaje a República Dominicana.
- **Neuquén:** tres casos notificados con antecedente de viaje a Brasil, en el departamento de Lácar, en San Martín de los Andes.
- **Santa Fe:** dos casos notificados con antecedente de viaje a Maldivas (DENV-3), en el departamento de San Cristóbal.

Serotipos circulantes

De un total de 34 serotipos identificados, se observa un predominio de DENV-2 (61,76%), seguido por DENV-3 (26,47%) y DENV-1 (11,77%).

Durante la SE 19 se notificó el primer caso de dengue con serotipo DENV-3, sin antecedente de viaje, en el departamento de El Carmen, provincia de Jujuy. Los DENV-3 restantes corresponden a notificaciones de casos con antecedente de viaje al exterior del país.

Caracterización clínica de los casos

La mediana de edad fue de 42 años. El grupo etario con mayor proporción de casos es el de 45 a 65 años, seguido por los grupos de 35 a 44 años y de 25 a 34 años. El 58% de los casos notificados corresponde al sexo femenino.

De los 70 casos confirmados de dengue, 69 cuentan con información completa con respecto a la evolución clínica. Trece casos (19%) requirieron hospitalización, sin necesidad de ingreso a cuidados intensivos; uno de ellos fue clasificado como dengue con signos de alarma en la SE 16. Se trató de un caso de 50 años, con residencia en Villa Real (CABA), confirmado por laboratorio mediante detección de DENV-2, que permaneció un día en unidad de cuidados intermedios y luego fue dado de alta.

En 54% de los casos que requirieron internación se determinó el serotipo DENV-2 (7 casos). No se han notificado casos graves ni fallecimientos.

En Argentina, la vigilancia epidemiológica del dengue se analiza en función de temporadas, en lugar de años calendario, debido al carácter estacional de la transmisión viral. Si bien existe una alta heterogeneidad en el territorio nacional, esta estacionalidad está determinada por las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del mosquito *Aedes aegypti*, vector responsable de la transmisión del virus. Durante los meses más cálidos y húmedos del año, que comprenden principalmente la primavera, el verano y parte del otoño, se registra un aumento en la abundancia poblacional del vector y, consecuentemente, se generan condiciones que permiten la ocurrencia de brotes. Por el contrario, durante el invierno la actividad reproductiva del vector disminuye considerablemente, interrumpiéndose en gran parte del territorio nacional.

La definición operativa de temporada permite estructurar la vigilancia en un marco temporal en consonancia con la dinámica de transmisión, facilitando el análisis comparativo entre períodos y la planificación de las acciones de prevención y control. En este sentido, la temporada de dengue en Argentina se delimita entre la semana epidemiológica (SE) 31 de un año y la SE 30 del año siguiente, abarcando el período de mayor riesgo para la circulación viral.