

# LINCOMICINA-ESPECTINOMICINA

## Antibiótico de amplio espectro



### Fórmula:

Cada ml. de solución contiene:  
Lincomicina .....50 mg  
Espectinomicina .....100 mg  
Excipientes .....c.s.p.

### Propiedades:

La Lincomicina es activa específicamente contra las bacterias Gram-positivas, anaerobias y micoplasmas. *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. *Erysipelothrix*. La Espectinomicina es activa contra una serie de microorganismos Gram-negativos, micoplasmas y algunos cocos Gram positivos. La combinación posee un amplio espectro de actividad antibacteriana.

**Este producto a sido aprobado en Holanda y se comercializa de la siguiente manera:**

### 1) Indicaciones:

Infecciones originadas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativos, micoplasmas, anaerobias e infecciones de las meninges. Infecciones profundas a nivel óseo.

Cerdos: Disentería, infecciones causadas por micoplasmas (artritis infecciosas, neumonía), *E.coli* enteritis, Erysipelas.

Vacas y Terneros: Enteritis y neumonía, *Pietin*, *campylobacter*, Mastitis Agudas.

Ovejas, cabras: Dermatitis contagiosa interdigitalis ovis.

Aves: CRD, *E.coli* tracheitis, enteritis (*Salmonella*, *Treponema*, *E.coli*).

Perros: Infecciones respiratorias e infecciones de la piel tales como piodermias originadas por *Streptococcus* spp.

Gatos: Infecciones respiratorias originadas por cocos Gram-positivos.

-infecciones de la piel originadas por *Streptococcus* spp.

-infecciones de las vías urinarias originadas por cocos Gram-positivos sobre base de un antibiograma específico.

### 2) Administración y dosificación:

Por inyección intramuscular o subcutánea (aves):

Cerdos: 1 ml por 10 kg p.v. la dosis puede repetirse si es necesario cada 24 horas durante 3-7 días.

Bovinos: 1 ml por 10 kg p.v. durante 2 días; terneros con problemas agudos: dos veces el primer día seguido de una inyección cada 24 horas durante 2 a 4 días.

Oveja, cabra: 1 ml por 10 kg p.v. una vez al día durante 3 días.

Perro, gato: 1 ml por 5 kg p.v. La dosis puede repetirse cada 12 o 24 horas durante un máximo de 21 días.

Aves: 0,5 ml por 2,5 kg p.v. una vez al día durante los 3 días siguientes.

### Período de suspensión:

Carne: 21 días.

Leche: 48hs (4 ordeños).

### Contraindicaciones:

No utilizar en Equinos, Conejos y demás roedores. No usar junto a miorrelajantes.

**Almacenamiento:** Fresco (4-15c) y fuera de la influencia de la luz.

**Presentación:** 12 frascos de 100 ml.



## COMPañIA FARMACEUTICA

BIOLOGICOS FARMACOS



**Etica, calidad y prestigio en Medicina Veterinaria**

Planta Santa Fe: Balcarce 951 - Tel.Fax (0342) 4538777 - 4559773 - (3000) Santa Fe - Argentina  
Planta La Plata: Ruta 36 esquina 78 - Tel. (0221) 4962392 - (1901) Lisandro Olmos - Buenos Aires - Argentina  
E-mail: [allignanihnos@ciudad.com.ar](mailto:allignanihnos@ciudad.com.ar) - Web: [www.allignanihnos.com.ar](http://www.allignanihnos.com.ar)